

Cloreto de Potássio

Solução Injetável a 19,1%



USO HOSPITALAR

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome do Produto: Cloreto de Potássio

Forma farmacêutica e apresentações

Solução Injetável, Estéril e Apirogênica.

• Embalagem Primária

Ampolas plásticas transparentes contendo 10mL

• Embalagem Externa

- Embalagem de papelão com 08 cartuchos contendo 100 ampolas plásticas de 10mL

Via de administração

Via parenteral. Para uso intravenoso e intramuscular.

USO ADULTO E PEDIÁTRICO

Composição

Cloreto de Potássio 19,1 g.
Água para Injeção q.s.p..... 100,0 mL.

INFORMAÇÕES AO PACIENTE

Ação do Medicamento

Dentro das características do produto, e desde que corretamente utilizado conforme as orientações impostas por todos os itens de prescrição, este desenvolve plenamente sua eficiência terapêutica durante o tratamento.

Prazo de Validade

Seu prazo de validade é de 24 meses a partir da data de fabricação, ao que após este prazo pode não mais apresentar os efeitos desejados. Ao adquirir qualquer medicamento verifique sempre o prazo de validade impresso na embalagem. Não use medicamento com prazo de validade vencido, além de não obter o efeito desejado pode ser prejudicial para sua saúde.

Indicações

Na hipopotassemia, hipocalemia, distúrbios do equilíbrio ácido base.

Contra-indicações

Na insuficiência renal crônica e aguda e em portadores de anemia falciforme.

Precauções e advertências

Evitar o uso quando constatado odor desagradável ou corpos estranhos no produto. Manter fora do alcance das crianças. Se houver turvação no produto ou indícios de violação do frasco, o mesmo não deverá ser utilizado.

Possíveis Interações

Evitar administração simultânea com outros medicamentos, no intuito de evitar interações.

Não deve ser utilizado durante a gravidez e a amamentação, exceto sob orientação médica. Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se ocorrer gravidez ou iniciar amamentação durante o uso deste medicamento.

Não há contra-indicação relativa a faixas etárias.

Informe ao médico ou cirurgião-dentista o aparecimento de reações desagradáveis.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

Modo de usar

Deve ser utilizado conforme orientações prescritas no item posologia. Por ser de caráter estéril, não se procede em hipótese alguma a guarda e conservação de volumes restantes das soluções utilizadas, devendo as mesmas serem descartadas.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.

Não interrompa o tratamento sem o conhecimento de seu médico.

Não use medicamento com prazo de validade vencido. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Reações adversas

Informe seu médico o aparecimento de reações desagradáveis. Situações de intolerância ao Cloreto de Potássio por parte do organismo podem gerar reações adversas como náuseas, enjôos, indisposições eventuais, etc. que desaparecem com a descontinuação do uso do produto.

Superdose

Na eventualidade de administrações acidentais com doses muito acima das orientadas, procurar por socorro médico imediatamente para as devidas medidas de controle.

Cuidados de conservação

Conservar ao abrigo do calor, umidade e luz natural direta.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Características Farmacológicas

O Cloreto de Potássio, é quantitativamente o principal constituinte eletrolítico do espaço intracelular. Desempenha um papel essencial na manutenção do volume intracelular graças ao equilíbrio hidroeletrólítico e estabilidade de membrana celular. É ativador do ATPases da membrana envolvida em trabalhos osmóticos (transporte ativo).

Resultados de Eficácia

Como objeto de estudo, a eficiência terapêutica do produto se fez consagrada e registrada no meio científico pelo seu uso e aplicação na prática da área farmacêutica.

Indicações

Na hipopotassemia, hipocalemia, distúrbios do equilíbrio ácido base.

Contra-indicações

Na insuficiência renal crônica e aguda e em portadores de anemia falciforme.

Modo de usar e cuidados de conservação depois de aberto

Uso endovenoso. Por ser de caráter estéril, não se procede em hipótese alguma a guarda e conservação de volumes restantes das soluções utilizadas, devendo as mesmas serem descartadas.

ATENÇÃO: Este medicamento não é um genérico, portanto não é um substituto de um outro medicamento que tenha o(s) mesmo(s) fármaco(s).

Posologia

Adulto: de 40 a 80 mEq (aproximadamente de 3 a 6 g de Cloreto de Potássio), em administração fracionada.

Crianças: de 1 a 1,5 mEq (77 a 105 mg) por quilo de peso, em administração fracionada.

Diluir o conteúdo de uma ampola em 500 ou 1000 mL de soluto adequado ao caso clínico e injetar via endovenosa lentamente, ate 180 gotas por minuto. Uma ampola a 19,10% contém aproximadamente 25 mEq de Potássio.

Advertências

Atenção: não misture medicamentos diferentes, a troca pode ser fatal. Certifique-se que está sendo administrado o medicamento prescrito. Deve-se ter extremo cuidado para não trocar as ampolas com soluções diferentes.

Evitar o uso quando constatado odor desagradável ou corpos estranhos no produto. Observar contra a luz e se houver turvação no produto ou indícios de violação do frasco, o mesmo não deverá ser utilizado. Deve ser administrado com cautela em pacientes portadores de insuficiência renal, queimaduras graves, acidose diabética nas fases iniciais, úlcera péptica. A intoxicação pelo potássio induz a paralisia flácida com parestesia e manutenção da consciência, arritmias cardíacas, bloqueio átrio ventricular, total desaparecimento da onda P, alargamento do complexo QRS, onda T Apiculada. Concentração elevada de potássio no sangue pode causar morte por depressão cardíaca, arritmia. Portanto, a solução injetável nunca deve ser administrada como tal, devendo ser adequadamente diluída para evitar aumento abrupto da concentração de potássio.

Uso em idosos, crianças e outros grupos de risco

Deve-se ter precaução especial em pacientes idosos debilitados ou não, sendo particularmente recomendável a utilização da menor posologia, porém eficaz.

Interações Medicamentosas

Não existe evidencia suficiente que demonstre ocorrência de interação clinicamente relevantes. Contudo, evitar a administração simultânea com outros medicamentos.

Reações adversas a Medicamentos

Ainda não são conhecidas a intensidade e a frequência das reações adversas. Não existem referências e evidências sobre alterações relevantes de exames laboratoriais após a utilização adequada e orientada de Cloreto de Potássio.

Superdose

Administração intravenosa de um sal de cálcio, glicose e insulina e bicarbonato de sódio. As resinas de troca iônica (sulfato de Poliestireno), que podem ser administradas oralmente ou instiladas via retal podem diminuir a hipercalemia de um dia.

Em pacientes digitálicos, a rápida diminuição do potássio do plasma pode causar toxicidade digitálica.

Armazenagem

O produto deve ser armazenado sob proteção de calor, umidade e luz natural direta.

Reg. M.S. nº 1.5592.0001.001.5

N.º Lote, Data de Fabricação e Validade: Vide Caixa.

Farmacêutica Responsável: Dra. Vanessa Fancelli Zachini - CRF-SP 22.568

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA.

CNPJ: 04.459.117/0001-99

Rua: General Augusto S. dos Santos, 465 Pq. Industrial Lagoinha
Ribeirão Preto SP

Fone: (16) 3965-1416

Indústria Brasileira

SERVIÇO DE ATENDIMENTO

(16) 3965-1416

www.samtec.com.br

sac@samtec.com.br