

Algivet®

POR **VETNIL**

MARCA / LINHA ANALGÉSICOS

Classificação: Analgésico

Espécies: Bovinos e Equinos

Sobre

PRINCÍPIO(S) ATIVO(S)

- Dipirona Sódica

RECEITA

Receita Simples

COMPOSIÇÃO

Cada mL do produto contém:

Fenildimetilpirazolona-metilaminometanosulfonato de Sódio (Dipirona Sódica) 0,5 g

Veículo q.s.p 1 mL

NÍVEIS DE GARANTIA

Cada mL contém:

Dipirona sódica - 0,5 g

ARMAZENAMENTO

Conservar na embalagem original, em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, à temperatura de 15° a 30° C. Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos.

TEMPO DE CARÊNCIA

Abate: O abate dos animais tratados somente deve ser realizado 28 dias após a última aplicação.

Leite: Este produto não deve ser aplicado em fêmeas produtoras de leite para o consumo humano.

REGISTRO NO MAPA

1.484 em 16/12/81

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Fábio Cavenaghi Mattei CRMV-SP 12005

Apresentações e concentrações

APRESENTAÇÕES E CONCENTRAÇÕES

- Algivet®, frasco ampola (50 mL)

Indicações e contraindicações

INDICAÇÕES

Para a prevenção e combate às dores das cólicas e outros estados do tipo espástico de órgãos da cavidade abdominal, artrites agudas e crônicas, estados reumáticos dos músculos e articulações. Neurites e nevralgia.

Nas obstruções esôfago-faríngeas por corpos estranhos. Nos espasmos do colo uterino durante o parto; nas dilatações agudas do estômago; nas gastrites dos animais domésticos de pequenos porte para prevenir o vômito.

Administração e doses

VIA(S)

- IM
- IV

FREQUÊNCIA DE UTILIZAÇÃO

As aplicações podem ser repetidas no mesmo dia, imediatamente após cessar o efeito analgésico, sem inconveniência.

DOSAGEM INDICADA

Bovinos

Dosagem para **Bovinos**

Recomendado

8 mL / 100 kg

INDICAÇÃO: 0 mL

Equinos

Dosagem para **Equinos**

Recomendado

20 - 40 mL / animal

Potros e Bezerros

Dosagem para **Bovinos e Equinos**

Recomendado

5 - 15 mL / animal

OBSERVAÇÕES

As dosagens acima podem ser utilizadas por via endovenosa ou intramuscular.

As vias endovenosas e intramuscular podem ser usadas concomitantemente, quando se deseja um efeito rápido, é mais preferível a utilização da via endovenosa.

Não se recomenda a aplicação por via subcutânea, devido à ocorrência de eventuais irritações tissulares.

Alterações na posologia a critério do Médico Veterinário.

Interações medicamentosas

OBSERVAÇÕES DA INTERAÇÃO

Não informado

AVISO LEGAL - INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

O Aplicativo Vet Smart contém informações de interação medicamentosas em geral, que foram levantadas por pesquisa realizada pelo próprio Vet Smart, de modo que as informações médicas e sobre medicamentos não é um aconselhamento médico veterinário e não deve ser tratado como tal. Portanto, a Vet Smart não garante nem declara que a informação sobre tratamentos médicos veterinários ou interações medicamentosas do Aplicativo Vet Smart: (A) estará constantemente disponível, ou disponíveis a todos; ou (B) são verdadeiras, precisas, completas, atuais ou não enganosas.

Farmacologia

FARMACODINÂMICA

Algivet exerce uma ação analgésica central, produz um notável efeito tranquilizador sobre os animais, sem provocar depressão sexual.

Devido ao efeito espasmolítico sobre a musculatura lisa, ocorre uma dilatação dos vasos sanguíneos periféricos, resultando em maior afluência de sangue para a musculatura estriada, o que é fisiológica e terapeuticamente desejável.

Algivet não exerce nenhuma ação desfavorável sobre a circulação sanguínea, coração, rins, ou qualquer outro órgão.

Seu efeito é observado depois de 10-15 minutos, prolongando-se por algumas horas.

Nos casos dos animais voltarem a apresentar dores e inquietude, pode-se repetir o tratamento sem inconvenientes.

Nas cólicas, a ação de Algivet consiste no estímulo do peristaltismo, tranquilização e espasmólise, enquanto o seu efeito analgésico representa um valioso apoio terapêutico.