



Emedron[®]

Ondansetrona 1 %

USO VETERINÁRIO

ANTIEMÉTICO INDICADO PARA CÃES E GATOS

Fórmula:

Cada 1 mL contém:

Cloridrato de ondansetrona diidratado*12,5 mg

Veículo.....q.s.p.....1 mL

*equivalente a 10 mg de Ondansetrona base.

Informações técnicas:

Emedron 1 % é uma medicação antiemética. Seu mecanismo de ação ocorre pelo antagonismo altamente seletivo dos receptores 5-HT₃ da serotonina. Esses receptores são encontrados no Sistema Nervoso Central (SNC) e periférico, responsáveis pelo vômito. Diferente da maioria das drogas antieméticas, os antiserotonérgicos não atuam em outros receptores, o que confere maior segurança ao medicamento.

Indicações:

Emedron 1 % é um antiemético antagonista dos receptores da serotonina do tipo 3 (5-HT₃) indicado para cães e gatos.

Posologia e modo de usar:

O produto deve ser administrado pela via intravenosa (IV), de forma lenta, conforme dosagem da tabela abaixo:

Espécies	Dosagem	Tratamento
Cães	1 mL/20 Kg (equivale a 0,5 mg/kg)	A cada 8 horas, durante 5 dias. Aplicação em no mínimo 3 minutos (*)
Gatos	1 mL/20 Kg (equivale a 0,5 mg/kg)	A cada 8 horas, durante 5 dias. Aplicação em no mínimo 1 minuto (*)

(*) Recomenda-se a administração acrescida de solução fisiológica a 0,9%.

A duração do tratamento deverá ser estipulada de acordo com a gravidade do quadro e a remissão dos sintomas, ou a critério do médico veterinário.

Contraindicações:

O produto não deve ser administrado em animais com antecedentes de hipersensibilidade a ondansetrona.

Interações medicamentosas:

Não administrar o **Emedron 1%** junto com os seguintes princípios ativos:

- Apomorfina: Há relatos de hipotensão severa com o uso concomitante deste medicamento, em humanos.
- Cisplatina e ciclofosfamida: Há relatos de redução das concentrações plasmáticas quando administrado concomitantemente a um destes fármacos.
- Tramadol: Há relatos da diminuição da eficácia de ambos os fármacos quando utilizados em associação, em humanos.



- Medicacões que afetam o intervalo QT (amiodarona, cisaprida, halotano, isoflurano e sotalol): a interaço pode resultar em arritmias graves.

Efeitos adversos:

A ondansetrona e um princpio ativo bem tolerado.

Sinais como constipao, sedao, sinais clnicos extrapiramidais, arritmias e hipotenso j foram relatados em seres humanos, nos quais a incidncia  inferior a 10%.

Precaucões:

Utilizar com cautela em animais com disfuno heptica, devido ao risco de aumento do tempo de meia vida do frmaco.

Utilizar com cautela em ces com mutao do gene MDR1, j que se desconhece sua relao com a glicoprotena P na espcie.

At o momento, no foram realizados estudos em animais jovens, fmeas prenhes ou em lactao.

Manter o produto em sua embalagem original.

Manter o produto livre de contaminaes externas (para injetveis).

No utilizar o produto em caninos e felinos abaixo de 12 meses.

Superdosagem:

O produto  seguro quando administrado em at 5 vezes a dose indicada, ou seja, em at 2,5 mg/Kg de peso corpreo, a cada 8 horas, durante 5 dias consecutivos.

Apresentao:

Frasco de vidro mbar contendo 10 mL.

Conservar em local seco,  temperatura ambiente (15°C a 30°C),
ao abrigo da luz solar direta e fora do alcance de crianas e animais domsticos.

Aps abertura do frasco, o contudo deve ser utilizado em 30 dias.

Espcies	Dosagem	Tatamento
Ces	1 mL/20 kg	A cada 8 horas, durante 5 dias.
Catos	1 mL/20 kg	A cada 8 horas, durante 5 dias.

**VENDA SOB PRESCRIO E ADMINISTRAO
SOB ORIENTAO DO MDICO VETERINRIO**

Licenciado no Ministrio da Agricultura sob o n SP 000292-5.000015 em 01/07/2019.

Responsvel Tcnico:
Vnia N. A. de Carvalho
CRF-SP n 32.871



Proprietrio e Fabricante:
UNIAO QUMICA FARMACUTICA NACIONAL S/A

Rua Cel. Luiz Tenrio de Brito, 90
Embu-Guau – So Paulo – CEP 06900-000
DDG 0800 701 1799 – CNPJ 60.665.981/0001-18
Indstria Brasileira



10/2022

4020080 - 100 x 150 mm - Laetus 123