

Trissulmax Injetável

USO VETERINÁRIO

FÓRMULA: Cada 100 mL do produto contém:

Sulfadoxina ----- 20,00 g

Trimetoprim ----- 4,00 g

Água estéril q.s.p. ----- 100,00 mL

INDICAÇÕES:

TRISSULMAX INJETÁVEL é uma associação que atua em bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, sendo sua principal indicação para infecções causadas pelos seguintes microrganismos: *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Salmonella Dublin* e *Staphylococcus aureus*.

Espécie a que se destina: bovinos.

DOSAGEM: Dosagem do produto em mg por kg.

Dose: 15 mg/kg da associação do produto que corresponde a 1 mL para cada 16 kg de peso vivo (equivalente a 12,5 mg de sulfadoxina e 2,5 mg de trimetoprim).

DURAÇÃO DO TRATAMENTO:

Administrar a dose do produto a cada 24 horas durante 3 dias ou de acordo com a orientação do médico veterinário.

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: Intramuscular.

CONTRAINDICAÇÕES E EFEITOS ADVERSOS:

Esta combinação deve ser utilizada com cautela em pacientes com doença hepática ou renal pré-existente. Pode ocorrer toxicidade crônica das sulfas, ocorrendo a cristalúria sulfonamídica, sendo esse efeito relacionado com a precipitação das sulfas e principalmente de seus metabólitos acetilados nos túbulos contornados renais, sendo os principais sinais clínicos: diminuição da micção e dor, hematúria e cristalúria; reações de toxicidade aguda podem seguir a injeção intravenosa rápida, com sintomas de hipersensibilidade, sinais neurológicos, êmese, ataxia, debilidade muscular, paresia espástica e convulsões. Não é indicado o uso em fêmeas prenhes ou lactantes e animais abaixo de 10 meses de idade.

PRECAUÇÕES:

Obedecer a dosagem indicada para o uso do produto. Hidratação do paciente: o animal deverá ter livre acesso à água quando receber tratamento sulfonamídico. Evitar tratamentos prolongados. Não administrar o produto com prazo de validade

Nº 320-10

vencido. Armazenar e manter o medicamento em local seco, fresco e ao abrigo da luz, em temperatura entre 15 °C e 30 °C. Seguir corretamente as indicações e instruções para o uso. Armazenar e manter o medicamento fora do alcance de crianças e animais domésticos. Os frascos vazios devem ser descartados de acordo com a Legislação Ambiental vigente na região.

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:
BOVINOS: ABATE - O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 8 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.
BOVINOS: LEITE - O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 2 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Registrado no Ministério da Agricultura sob nº PR 000007-8.000018 em 07/05/2004.

Proprietário e fabricante:

Dechra Brasil Produtos Veterinários Ltda.
Travessa Dalva de Oliveira, 237 - Parque das Indústrias Leves
CEP: 86030-370 - Londrina, Paraná, Brasil
CNPJ: 79.578.266/0001-76 - Indústria Brasileira
SAC: 0800 400 7997 - www.dechra.com.br
Responsável Técnica: Dr^a. Vera Lúcia Fernandes.
CRMV-PR nº 3.014.

